

REPORTE AVES ENFERMAS

- Reporte la pérdida significativa de bandada o enfermedad inusual en aves domésticas o aves silvestres para que estos incidentes puedan ser investigados. ¡La detección temprana puede hacer una diferencia!
- El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida y la Comisión de Conservación de Peces y Especies Silvestres de Florida han incrementado la vigilancia de la gripe aviar en las aves de corral domésticas y aves silvestres.

Aves domésticas

Reporte la enfermedad inusual o muertes en las aves de corral domésticas al Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, División de Industria Animal, al (850) 410-0900 www.FDACS.gov/ai. Después de horas regulares de oficina, llame al 1-800-342-5869.

Aves silvestres

La muerte de aves silvestres se debe reportarse a la Comisión de Conservación de Peces y Especies Silvestres de Florida en <https://myfwc.com/research/wildlife/health/mystery/> o a su oficina local de FWC.

Conozca los signos de advertencia de las enfermedades infecciosas en las aves:

- Aumento repentino de las muertes de aves en su bandada.
- Estornudos, dificultad para respirar, tos, y secreción nasal.
- Diarrea acuosa y verde.
- Depresión y falta de apetito.
- Disminución en la producción de huevos.
- Hinchazón alrededor de los ojos, cuello y cabeza.
- Decoloración púrpura de la barba, la cresta y las patas.
- Temblores, alas caídas, caminando en círculos o desorientación, torsión de la cabeza y el cuello, o falta de movimiento.

Cómo proteger su bandada:

- Mantenga su distancia: limite el tráfico dentro y fuera de la propiedad.
- Mantenga todo limpio: Use blanqueador u otros desinfectantes en sus zapatos, ropa, las manos, jaulas, equipos y llantas de vehículos. Deseche correctamente las aves muertas.
- No lleve enfermedades a su casa: Si ha estado alrededor de otras aves, siga los pasos anteriores. Si ha mostrado las aves en ferias o exposiciones, manténgalas separadas del resto de la bandada durante dos semanas después del evento. Las aves nuevas deben mantenerse separadas por lo menos 30 días.
- Conozca los signos de advertencia de la enfermedad: la detección temprana es importante para prevenir la propagación de enfermedades.
- Reporte aves enfermas – domésticas y/o silvestres.



Cómo Puede Protegerse Usted Mismo

Manipulación de aves de corral

- Trabaje en áreas bien ventiladas.
- Trabaje en dirección contraria del viento para disminuir el riesgo de inhalar aerosoles tales como polvo, plumas o caspa.
- Cuando sea posible, use guantes de látex desechables o que puedan ser desinfectados.
- Cuando sea posible, use gafas o caretas protectoras mientras trabaja con las aves.
- Lávese las manos con frecuencia con jabón y agua.
- Desinfecte las superficies de trabajo y equipos.
- No coma, beba ni fume mientras manipula las aves.

Manipulación de aves silvestres

- Las precauciones deben incluir: lavar sus manos, limpiar, preparar y cocinar la comida adecuadamente.
- No manipule ni coma aves silvestres que estén enfermas.
- Use guantes desechables de látex mientras prepara aves silvestres para comer, y lave bien sus manos, cuchillos, equipos y superficies que estuvieron en contacto con las mismas.
- No coma, beba ni fume mientras manipula las aves.
- Los virus de la gripe aviar son destruidos por el calor y no son transmitidos a través de comida bien cocinada. Todas las aves deben ser cocinadas adecuadamente (cocción completa o a 165 grados F).

