

Si los cerdos son retenidos en propiedad privada, las instalaciones deben estar registradas con FDACS como instalaciones aprobadas o autorizadas para albergar cerdos silvestres (FSHF sigla en inglés) cumpliendo los siguientes requisitos:

1. Las instalaciones deben ser mantenidas en condiciones sanitarias y de limpieza todo el tiempo.
2. Las instalaciones deben estar en tal condición que impidan el escape de los cerdos en cautiverio.
3. Las instalaciones no pueden estar en cercanías o adyacentes a rebaños de cerdos domésticos.
4. Dichas instalaciones solo pueden albergar cerdos silvestres. Y ningún otro animal como perros o gatos pueden estar en contacto directo con dichos cerdos silvestres.
5. El dueño o administrador debe mantener récords de todos los cerdos que entran y salen durante un año y tenerlos disponibles en caso tal que el representante del Departamento se los solicite.
6. El dueño o administrador de las instalaciones debe ser un Comerciante de Cerdos Silvestres registrado (FSD).



TRAMPEROS PORCINOS SALVAJES DE LA FLORIDA

CERDOS SILVESTRE EN LA FLORIDA



Para más información acerca de cerdos silvestres,
contacte la Oficina del Veterinario Estatal o visite
nuestro sitio web:

Oficina del Veterinario Estatal

Teléfono: (850) 410-0900

Línea gratuita: 1-877-815-0034

Fax: (850) 410-0916

Línea 24 horas: 1-800-342-5869

www.FreshFromFlorida.com/ai

División de Industria Animal
Departamento de Agricultura y servicios
al Consumidor de la Florida



**Florida Department of
Agriculture and Consumer Services**

Cerdos Silvestres en la Florida

El cerdo no es una especie animal nativa en América y fue introducida en nuestros puertos por colonizadores de España y resto de Europa. Independientemente de su procedencia, su población ha crecido a un número aproximado a los 4 millones de cerdos silvestres, distribuidos en más de 39 estados. A pesar de que algunos de estos animales tienen una apariencia distintiva de "jabalí silvestre", otros lucen parecidos a razas de cerdos domésticos. En los ambientes donde ellos sobreviven adecuadamente logran impactar notoriamente la región, causando un extenso daño al ambiente natural y a las especies domesticas a través de la competencia por la comida, destrucción del hábitat, y la potencial introducción de enfermedades. Se estima que hay más de 1 millón de estos animales en la Florida actualmente.

Los costos monetarios al Estado por causa de los daños ocasionados por estos cerdos en el hábitat son considerables. Debido a la alta fertilidad de los cerdos silvestres, capaces de producir dos camadas por año, su control se hace difícil. Para minimizar la amenaza de cerdos silvestres a los rebaños de cerdos domésticos, los productores deben tomar medidas para prevenir la convivencia de sus cerdos con cerdos silvestres.

Enfermedades en los Cerdos Silvestres

Los cerdos silvestres son portadores de varias enfermedades infecciosas que pueden ser transmitidas al ganado doméstico y a los humanos, incluyendo la altamente contagiosa Brucelosis y Pseudorabia. La Brucelosis Porcina es causada por una bacteria, y mientras esta enfermedad usualmente desaparece sin causar muerte en los animales, puede permanecer en la manada por años. Los cerdos silvestres comúnmente son la fuente de Brucelosis en cerdos y ganado bovino doméstico. Brotes de Brucelosis en humanos han sido reportados en trabajadores de plantas de sacrificio y empaque de carne, y la fuente inicial es cerdos infectados. Cazadores y atrapadores de cerdos silvestres también pueden contraer la Brucelosis Porcina por la manipulación de tejidos infectados. Los signos de infección por Brucelosis son: síntomas "gripales" con fiebre "ondulante" o recurrente, escalofríos, y dolor articular y muscular.

La Pseudorabia, o enfermedad de Aujeszky, es una enfermedad de tipo viral portada por cerdos silvestres que puede conllevar a altas tasas de mortalidad en cerdos domésticos, y puede afectar otros animales domésticos y silvestres. A pesar de que los humanos no están en riesgo de enfermarse por este virus, puede ser mortal en perros de caza expuestos a cerdos silvestres infectados.

Leptospirosis es una enfermedad bacteriana en cerdos que también causa síntomas parecidos a los de la gripe o hepatitis en humanos. Se puede contraer por el contacto de agua, orina o tejidos contaminados de animales infectados. Triquinosis es una enfermedad parasítica de importancia en salud pública. La infección en humanos se da por consumir carne contaminada que no ha sido cocinada adecuadamente. Fiebre Porcina Clásica es una enfermedad exótica en USA, que, en caso de ser introducida en este país, podría ser fácilmente esparcida por cerdos silvestres. Debido al riesgo de transmisión de estas y otras enfermedades, el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de la Florida (FDACS), División de Industria Animal, tiene establecidos programas de vigilancia epidemiológica donde hace pruebas de laboratorio a cerdos silvestres y cerdos alimentados con desperdicios alimenticios, los cuales son considerados en alto riesgo de contraer estas enfermedades. Cazadores están en alto riesgo de

infectarse con Brucelosis Porcina, Leptospirosis y Triquinosis si no toman medidas preventivas apropiadas cuando manipulan cerdos silvestres. Medidas de seguridad deben incluir: uso de guantes al manipular y limpiar los cerdos que cazan, evitar contacto directo con sangre y órganos reproductivos, enterrando o quemando los guantes y restos del cerdo preparado, limpiando con agua caliente y jabón después de despresar dicho animal, y cocción completa de la carne de estos animales antes de comerla.

Caza y Captura de Cerdos Silvestres

Cazar y atrapar cerdos silvestres no solo es un deporte popular en la Florida, sino también un método útil de control de sobrepoblación en tierras privadas, públicas y estatales. FDACS ha establecido regulaciones con el fin de controlar la transmisión de enfermedades en la población porcina doméstica.

Por medio de estas regulaciones, Florida ha podido mantener su estado como libre de Pseudorabia y Brucelosis Porcina en sus rebaños comerciales. Individuos capturando cerdos silvestres en tierras privadas, públicas o estatales deben registrarse con FDACS como Comerciante de Cerdo Silvestre o FSD sigla en inglés (Feral Swine Dealer). Estos recibirán una tarjeta de identificación que deben portar en el momento que estén transportando cerdos silvestres. El comerciante también debe tener récords exactos de todos los movimientos de cerdos y tenerlos disponibles si son solicitados por cualquier Oficial de Ley Agrícola o agente autorizado de FDACS. Dichos récords deben incluir fecha de movimiento, lugar de captura del animal, cantidad y destino de dichos cerdos. El Comerciante de Cerdos Silvestres (FSD) debe limitar la reubicación a áreas o instalaciones donde estos no tengan contacto directo con manadas de cerdos domésticos. La disposición final de los cerdos silvestres será limitada solo a lo siguiente:

1. Desplazamiento a sacrificio;
2. Transporte a reservas de caza;
3. Desplazamiento a instalaciones aprobadas para albergar cerdos silvestres.

