

INFLUENZA AVIAR

“GRIPA AVIAR”

PREGUNTAS FRECUENTES



**Departamento de Agricultura y
Servicios al Consumidor de Florida**



¿Qué es la Influenza Aviar/Gripa Aviar?

- **Influenza Aviar = IA = “Gripa Aviar”**
- IA se refiere al virus de Influenza Aviar Tipo A el cual causa infección en aves.
- Aves acuáticas silvestres, actúan como reservorios naturales para muchos tipos de IA, y pueden portar y transmitir estos virus sin exhibir síntomas de enfermedad.
- IA afecta muchas especies de aves, incluyendo pollos, pavos, aves de deporte (caza), ratites (grandes aves), aves acuáticas, y aves silvestres, pero afecta más comúnmente aves domésticas. IA es una enfermedad extremadamente rara en aves exóticas y de compañía.
- No es común que la Influenza Aviar infecte a los seres humanos.

¿Son todos los virus de la Influenza Aviar iguales?

- No todos los virus de Influenza Aviar son iguales. Hay muchos tipos de IA diferentes. La H y la N listadas en el tipo viral representan las diferentes proteínas de superficie encontradas en cada uno de ellos. Hay 16 diferentes Hs y nueve Ns lo cual permite muchas combinaciones diferentes del virus, como H5N1, H1N1, y H7N2.
- H5 y H7 son los dos tipos que afectan las aves.
- Existen también muchos subtipos dentro de cada cepa viral, por ejemplo, una H5N1 puede ser diferente a otra H5N1.
- Patogenicidad se refiere a la habilidad que una cepa viral tiene para causar la enfermedad. En este caso, causar enfermedad en aves

domésticas. IA de baja patogenicidad (LPAI) causa pocos o ningún síntoma de la enfermedad y una baja mortalidad. IA de alta patogenicidad (HPAI) causa enfermedad de síntomas agudos en aves con signos severos de enfermedad respiratoria y alta mortalidad.

- Cepas de baja patogenicidad pueden mutar a alta patogenicidad y afectar gran número de aves.
- La cepa de mayor mortalidad es la llamada Cepa Asiática, También conocida como “Gripa Aviar Asiática” causada por una cepa de alta patogenicidad (HPAI) H5N1 aviar.

¿Hay actualmente presencia de IA en los Estados Unidos?

- Si, regularmente las aves acuáticas portan la cepa de baja patogenicidad. Ocasionalmente también hay casos de LPAI en aves domésticas con síntomas moderados.
- A partir de 2021, se ha documentado un aumento en la tasa de detección de IAAP en la población de aves silvestres y domesticas.

¿Como se contagian las aves con IA?

- Las aves infectadas reparten el virus a través de saliva, secreciones nasales y heces fecales. Aves susceptibles se infectan cuando entran en contacto directo con el virus o con secreciones y/o fómites (Substancias u objetos que contienen el virus).
- Transmisión del virus a través de jaulas, comida, agua, equipos,



vehículos, botas, roedores, etc., pueden incrementar el contagio sin necesidad de contacto con otras aves.

- El virus puede ser neutralizado con desinfectantes, calor y secado, pero si está protegido por material orgánico (heces fecales, plumas, partículas de huevos, etc.) puede sobrevivir por semanas.

¿Cuáles son los síntomas de IA en aves?

- Los síntomas de la enfermedad pueden variar desde no síntomas clínicos a enfermedad severa y muerte.
- Los signos de (LPAI) cepa de baja patogenicidad pueden incluir ligera descarga ocular y nasal, depresión y baja producción de huevos.
- Signos de (HPAI) cepa de alta patogenicidad incluyen los síntomas anteriores más inflamación de la cabeza, necrosis de tejidos (con desprendimiento de piel), muerte súbita y alta mortalidad.

¿Qué debo hacer si tengo aves enfermas o una alta mortalidad en mis aves?

- Encontrar un ave muerta ocasionalmente no es una ocurrencia inusual en bandada de aves silvestres o domésticas.
- El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de la Florida (FDACS), y su División de Industria Animal, investiga casos de muerte y enfermedad inusual en aves para ayudar a dueños y veterinarios a determinar la causa de ello.
- Contacte la oficina de FDACS al (850) 410-0900 o a www.FDACS.gov/RAD para reportar una alta o inusual mortalidad en aves.
- Contacte la Comisión de Conservación de Peces y Especies Silvestres de la Florida (FWC) para reportar mortalidad de aves silvestres en el sitio web www.MyFWC.com/bird.
- Esta enfermedad puede ser confundida con otras enfermedades aviares, por ello es crucial emplear pruebas diagnósticas de laboratorio.

¿Como protejo mis aves de la IA?

- Prácticas de Bioseguridad/Manejo de Prevención de Enfermedades:
- Personal: Evite visitar otras fincas de aves, ferias de exposición y mercados aviares. Si usted ha visitado otras instalaciones con aves,

es recomendable que usted tome una ducha y cambie de ropa y zapatos antes de ir a trabajar en su finca de aves.

Las personas deben usar ropa y zapatos protectores al visitar cualquiera de sus instalaciones.

- Equipos: No preste ni utilice equipos pertenecientes a otras fincas. Si lo hace, asegúrese de lavarlo y desinfectarlo muy bien antes y después de su uso. Lave y desinfecte su vehículo/remolques/jaulas (incluyendo llantas, chasis y carrocería) después de dejar una finca avícola o una exposición y/o mercado aviar. Este procedimiento debe ser aplicado también al reentrar a sus instalaciones. Mantenga sus galpones, corrales, equipos y áreas de trabajo siempre limpias y desinfectadas.
- Aves: Mantenga una bandada cerrada. No introduzca aves nuevas de exposiciones o mercados avícolas directamente a sus aves. Separe nuevas aves lejos de su bandada por un mínimo de 4 semanas para determinar si presentan signos de alguna enfermedad. Mantenga sus aves alejadas de aves silvestres o lagunas donde halla aves acuáticas. Lleve aves enfermas o muertas a un laboratorio diagnóstico para



determinar la causa de la enfermedad.

- Roedores y aves silvestres: Mantenga roedores y aves silvestres alejados de sus galpones y corrales. Utilice control de roedores, mantenga el pasto corto, recoja cúmulos de basura y no deje anidar aves silvestres en cercanía de sus aves.

¿Se pueden vacunar las aves contra la IA?

- En este momento, vacunar aves contra IA no es una opción.
- La vacunación no es usada rutinariamente pues podría interferir con pruebas de vigilancia epidemiológica ya que ambos, las aves vacunadas, así como las infectadas mostrarán un resultado positivo para la prueba de IA.
- La vacunación no previene que las aves se infecten o dispersen el virus, pero puede ayudar a reducir presentación clínica de la



enfermedad y pérdidas por mortalidad.

- La mejor protección contra la IA es la práctica de medidas de Bioseguridad.

¿Qué precauciones debo tener si viajo internacionalmente?

- La preocupación más grande es introducir a sus propios animales accidentalmente una enfermedad exótica por medio de ropa, plumas, productos alimenticios, etc.
- Si usted entra en contacto con ganado o aves en el extranjero, restrinja cualquier contacto con este tipo de animales después de retornar a su casa por un mínimo de cinco días.
- Lave y limpie concienzudamente toda la ropa, zapatos y equipos que haya utilizado en el viaje después de regresar a su casa.

¿Qué tipo de vigilancia epidemiológica aviar se está realizando ahora?

- IA ha sido una gran preocupación en la industria avícola mucho antes de la aparición de la cepa HPAI H5N1 en los Estados Unidos en el 2015. En los Estados Unidos el monitoreo de IA continúa siendo rutinario.
- En Florida, FDACS realiza pruebas de laboratorio en producciones



avícolas comerciales y de patio. Necropsias son realizadas a todas las aves enviadas a nuestro laboratorio.

- Vigilancia epidemiológica es realizada en las ventas pequeñas de animales, mercados de animales vivos y también en botánicas.
- USDA tiene en marcha un programa de IA para monitorear pollos de engorde, pavos y gallinas ponedoras.

¿Qué sucede con las banadas infectadas con IA?

- El Veterinario del Estado dictara cuarentena a la finca para detener todo movimiento de aves, huevos y equipos. No se permitirá movimiento de aves y productos avícolas hacia afuera o adentro de las instalaciones.
- Se implementarán medidas de bioseguridad obligatorias para el personal y animales. Todos los edificios y equipos serán desinfectados y los desechos de nidaje serán quemados o descompuestos por calor para matar el virus.
- Pruebas de Vigilancia de las fincas productoras aledañas serán realizadas para determinar cuánto se ha expandido la enfermedad. Una vez las instalaciones han sido examinadas y encontradas libres del virus, repoblación de aves será permitida con la autorización del Veterinario de Estado.

¿Tiene la Florida un plan de respuesta a una epidemia de IA?

- Si, la Florida tiene un Plan de Respuesta y Contingencia para la Influenza Aviar.
- En cualquier epidemia o pandemia de influenza afectando humanos, el Departamento de Salud de la Florida tiene un plan para responder a una pandemia humana.

¿Porque preocuparnos acerca de H5N1?

- Históricamente, han ocurrido pandemias donde el virus de Influenza está involucrado causando grandes pérdidas de vidas a nivel mundial. En este momento, el virus de IA, en su presentación actual, no se contagia fácilmente de persona a persona.
- El virus aviar tendría que mutar, o cambiar, para poder fácilmente infectar y contagiarse entre humanos. FDACS y el Departamento de Salud del Estado de la Florida continuaran monitoreando el curso de este virus.



¿Qué precauciones deben tenerse durante la caza o el contacto con especies acuáticas?

- Los cazadores deben tomar precauciones al manipular aves acuáticas: Usar equipo de protección personal tal como guantes para minimizar la exposición al virus de la Influenza Aviar y otras enfermedades.
- Nunca coma, beba o fume mientras este manipulando aves.
- Higiene básica (lavado de manos después de manipular animales silvestres o cadáveres) es siempre recomendado, junto con preparación adecuada de comidas y cocción completa.
- Lavado de ropas cada día después de manipular aves.
- Monitoree síntomas parecidos a los de la gripa por una semana tras haber manipulado aves.
- Para más información, visite el sitio web: **www.MyFWC.com/bird**.




¿Las personas pueden contraer IA?

- Si, pero aún no han sido atribuidas muertes a la Cepa Americana de IA la cual es normalmente hallada en aves acuáticas de los Estados Unidos.
- Muertes por la Cepa Asiática han sido reportadas en Asia y Europa, pero no en los Estados Unidos, pues esta cepa no ha sido reportada aun aquí. Aquellas personas afectadas por la cepa asiática tuvieron contacto cercano con aves infectadas o consumieron productos avícolas crudos o mal cocinados de aves infectadas. Los humanos siguen siendo considerados resistentes a este virus aviar actual.

¿Se puede contraer IA por consumir pollos o huevos?

- La IA no es considerada una enfermedad de origen alimentario en los Estados Unidos. Cualquier ave infectada con IA de Alta Patogenicidad será destruida antes de entrar en la cadena alimenticia.
- No hay riesgo de adquirir IA de productos avícolas adecuadamente cocinados. Cocinar aves a una temperatura interna de 165 grados F asegura su salubridad.





Conozca los síntomas de enfermedades animales exóticas y reportables.
Reporte cualquier signo o síntoma inusual inmediatamente a:

Oficina del Veterinario Estatal

Teléfono: (850) 410-0900

Línea gratuita: 1-877-815-0034

Línea 24 horas: 1-800-342-5869

Correo electrónico: RAD@FDACS.gov

División de Industria Animal
Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de la Florida

www.FDACS.gov/ai